



Pregnancy Help Australia Limited

資料頁

墮胎手術和並發症

墮胎是指刻意終止妊娠，從子宮移除胎兒和胎盤。它是一項外科手術，與任何其它外科手術一樣，對女性有一些相同的風險，以及墮胎手術本身所獨有的一些風險。

麻醉選擇：對於在妊娠前3個月內接受墮胎的女性，通常有3個麻醉選擇。

局部麻醉：您將被插入一根靜脈注射插管，通常是在手臂或手背上。在您手術過程出現緊急狀況而需要靜脈注射的情況下，會進行這種局部麻醉。局部麻醉藥物會被直接注入子宮頸。

局部麻醉的風險包括：

- 對麻醉藥物的局部反應
- 對麻醉藥物的全身過敏反應
- 感染，引起神經損傷及/或出血

【參考：昆士蘭衛生局出版物：關於您的麻醉 (Queensland Health publication: About Your Anaesthetic)】

• 靜脈鎮靜局部麻醉：

您將被插入一根靜脈注射插管，通常是在手臂或手背上。靜脈注射藥物將被直接輸送到您的血液中，以誘發鎮靜狀態，但並非無意識狀態。局部麻醉藥物將被直接注入子宮頸。

靜脈鎮靜局部麻醉的風險包括上述列舉的局部麻醉藥單獨使用時的風險，以及對所用靜脈注射藥物可能出現的反應。

• 全身麻醉：

您將被插入一根靜脈注射插管，通常是在手臂或手背上，並且注入藥物以誘發完全無意識狀態。您還可以選擇在您的鼻子和嘴巴上放置一個口罩，以吸入藥物。您將完全意識不到手術過程。

全身麻醉的一些常見副作用包括：

- 噁心或嘔吐
- 頭痛
- 注射部位疼痛及/或瘀傷
- 喉嚨和嘴唇疼痛或乾燥
- 視力模糊或複視
- 排尿問題

也可能出現一些不太常見的副作用，其包括：

- 肌肉疼痛
- 體乏無力
- 輕度過敏反應——瘙癢或皮疹
- 臨時神經損傷

還可能出現的一些不常見的副作用包括：

- 在麻醉藥物作用下存在意識
- 對牙齒或牙齒治療造成損傷
- 對喉頭和聲帶造成損傷，這可能會引起暫時性聲音嘶啞
- 對麻醉藥物的過敏反應及/或哮喘
- 腿部血液凝塊
- 癲癇發作

欲了解更多關於**妊娠支援服務**的資訊

如果您在昆士蘭州、新南威爾斯州、維多利亞州或澳大利亞首都領地，請致電 1300 792 798

如果您在南澳大利亞州、西澳大利亞州、塔斯馬尼亞州或北領地，請致電 1300 655 156

澳大利亞妊娠援助

www.pregnacysupport.com.au

- 胸部感染（更可能發生在吸煙者身上）
- 對神經及壓力性區域造成損傷

【參考：昆士蘭衛生局出版物：關於您的麻醉（Queensland Health publication: About Your Anaesthetic）】

更多關於麻醉的並發症及副作用的資訊，請諮詢昆士蘭衛生局網站，網址為www.health.qld.gov.au

墮胎手術

在妊娠12週以內，最常見的墮胎手術技巧稱為“子宮吸引術”。首先用一系列尺寸增大的桿將子宮頸擴張。再將一根管子通過子宮頸插入子宮當中，並且利用吸引器從子宮移除胎兒和胎盤。然後插入另一個稱為刮匙的儀器刮擦子宮壁，以確保沒有留下任何殘餘物。這個手術一般在15分鐘內完成。

妊娠超過12週時，採用不同的手術墮胎，因為此時胎兒更成熟，且更難用子宮吸引術移除胎兒。有兩種不同方法，但是它們都需要比妊娠前12週更進一步軟化和擴大子宮頸。可以通過口服激素阻斷藥物，或將其塞入陰道中，以軟化子宮頸。或者，可以利用桿和插入子宮頸中的產品擴張子宮頸。該產品將緩慢膨脹數小時，直到子宮頸寬到足以允許進行墮胎手術為止。該墮胎手術本身通常在1天或2天後進行。

（參考：維多利亞州政府Better Health網站，於2007年5月訪問）

墮胎並發症

墮胎的並發症包括上方列舉的所有麻醉並發症，以及：

- 子宮內出血過多及/或血液凝塊積聚，需要進一步進行外科手術
- 出血過多可能需要輸血
- 感染
- 子宮頸中的撕裂可能需要縫合
- 子宮壁及/或其它器官穿孔（撕裂或穿刺），它們可能會自愈，或可能需要手術修復，或在極少情況下，需進行子宮切除術（移除子宮）。
- 子宮及/或輸卵管感染。輸卵管的損傷增大了女性未來異位妊娠（輸卵管妊娠）的風險。
- 子宮頸無能力，可能損害未來生育能力
- 阿休曼症候群（月經停止及子宮黏連，可能會損害未來生育能力）
- 抑鬱、情緒紊亂、自殺風險增加

（參考：維多利亞州政府Better Health網站，於2007年5月訪問，Planned Parenthood Australia Informed Consent文件）

墮胎有更多並發症，國際上對於生理和心理上的並發症都開展了深入研究。如果您有興趣閱讀這項研究的一些內容，請訪問：www.afterabortion.org

欲了解更多關於**妊娠支援服務**的資訊

如果您在昆士蘭州、新南威爾斯州、維多利亞州或澳大利亞首都領地，請致電 1300 792 798

如果您在南澳大利亞州、西澳大利亞州、塔斯馬尼亞州或北領地，請致電 1300 655 156

澳大利亞妊娠援助
www.pregnancysupport.com.au