



Pregnancy Help Australia Limited

資料頁

化學墮胎 (RU486)

藥物流產或化學墮胎是一種在妊娠的前 9 週內替代外科手術墮胎的方法。該過程需要您訪問經過認證的診所或醫院進行超聲波檢查，以確定妊娠是否在 9 週以內，並且不是異位妊娠（輸卵管妊娠）。

米非司酮，通常被稱為 **RU486**，它在澳大利亞並不容易獲得。

某些身體病症不能服用 **RU486**，因此需要提取病人的醫療病史，並且病人應同意在墮胎的 2 週後返回，進行超聲波複查，以查驗藥物是否有效。在藥物流產出現問題的情況下，病人也應同意通過外科手術墮胎。

如果病人決定墮胎，她將會拿到一粒藥丸（米非司酮）以供服用，接著在約 24 小時後，在家服用另一粒藥丸（米索前列醇）。這通常會引起重度痙攣和出血，從而使妊娠終止。有時這個過程需要更長時間，但是如果超過 2 天，應當諮詢醫生。有些診所要求女性配備可靠的電話、交通工具，並待在離診所或醫院半小時車程的範圍內，以防流血過多或出現其他並發症。

在服用米非司酮後，病人可能會出現以下症狀：

1. 噁心或眩暈
2. 出血和痙攣，感覺像痛經（有時候是嚴重痙攣）
3. 頭痛、畏寒和腹瀉

醫生可以給予處理這些症狀的意見。墮胎過後至少 2 天內不宜飲酒、抽煙或服用違禁藥物。

墮胎手術後的一週內，建議您避免陰道性交、使用衛生棉條、游泳或沐浴，或進行任何劇烈活動。這會降低感染的可能性。

如果墮胎手術後的幾天內陰道出血不止，您應該去看醫生。

米非司酮不適合所有女性，尤其是那些正在服用抗凝血藥物的女性；對含米非司酮的藥物有過敏反應的女性；患高血壓的女性；裝有宮內節育器的女性（除非移除）或具有一些其他症狀的女性。這就是為什麼在開具處方之前應提取完整的醫療病史。

欲了解更多關於**妊娠支援服務**的資訊

如果您在昆士蘭州、新南威爾斯州、維多利亞州或澳大利亞首都領地，請致電 1300 792 798

如果您在南澳大利亞州、西澳大利亞州、塔斯馬尼亞州或北領地，請致電 1300 655 156

澳大利亞妊娠援助

www.pregnacysupport.com.au